

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège, rédigé en collaboration avec MM. Mailhol, Vène, Mirande (Ferme de Loudes), Moulet, Bicard (CAL) Donnat (Chambre Agri.), Barrière (Civam Razès), Bonhotte, Bournier, Boyer, Sicard (GVA) Dufretay, Sichez (FDGDEC), Bernard, Faure (PV)

N° 4 C du 19 Mars 1989

Grandes Cultures N° 3

Le réseau fonctionne à plein; de nombreuses cultures (plus de 100 parcelles) ont été visitées par l'ensemble des techniciens représentant les différents organismes participant à cette activité.

SOMMAIRE

- BLES** Etat sanitaire général bon **Pas de traitement**
si cas particulier consultez votre technicien
- ORGES** Etat sanitaire satisfaisant **Pas de traitement** sauf cas particulier à définir
avec votre technicien
- POIS** Pucerons souvent présents, Anthracnose et Bruches **traitement préventif**
- COLZA** Pucerons à surveiller dans quelques situations, plateau de Fanjeaux en particulier

BLES

ROUILLE BRUNE

On commence d'observer les premières pustules de rouille brune, mais cette maladie est très discrète cette année et les risques ne sont pas immédiats. Elle reste localisée à la base des plantes et est très dispersée; sauf cas particulier non observé par un des membres présents du réseau

AUCUNE INTERVENTION N'EST JUSTIFIEE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



OBSERVEZ VOS CULTURES DE BLE, un traitement est nécessaire si la Rouille Brune est présente au stade 8-9 (dernière feuille sortie) sur la quasi totalité des F4 et F3 d'une manière significative

OIDIUM

Observable pratiquement sur toutes les cultures; son intensité est liée à la densité; nous vous rappelons que cette maladie ne doit pas être traitée dans notre région, **pas d'intervention spécifique pour le moment attendez l'épiaison**

ORGES

Un seul cas de **ROUILLE NAIN** nous a été signalé sur le plateau de Fanjeaux

L'**OIDIUM** est présent sur l'ensemble des cultures

Sauf cas particuliers il n'y a pas de traitement à faire pour le moment

POIS PROTEAGINEUX

Ces cultures sont saines mais les conditions climatiques actuelles risquent de favoriser l'implantation de l' **ANTHRACNOSE** ; de nombreuses parcelles commencent à être colonisées par les **PUCERONS**

avec la floraison les **BRUCHES** vont apparaître et seront actives pendant les périodes chaudes; il convient de procéder à un **traitement de couverture généralisé** dès réception du présent avis, à l'aide de

BRAVO plus ou **CERECLAIR** 2 L/HA

B.T.F. 3,5 L/HA

PELTAR flo 5 L/HA

rajoutez au fongicide

SERK 1,5 L/HA

COLZA

Nombreux **MELIGETHES** mais inoffensifs au stade actuel des colza (formation des siliques) Quelques **CHARANCONS DES SILIQUES** mais loin du seuil de traitement qui est de 1 pour 2 plantes - à surveiller

PUCERONS rares colonies, le seuil de 2 colonies par m² n'est atteint nulle part surveillez toutefois vos parcelles et consultez votre technicien en cas de nécessité

T O U R N E S O L nous procédons au suivi biologique du **Phomopsis** et vous serez tenu au courant en temps voulu de l'évolution du risque

M A I S S E M E N C E suivi habituel du risque **Sésamie** qui vous sera communiqué en temps opportun

Tirage du 19 Mars 1989 - 1700 exemplaires

(c) Bulletin technique des Avertissements Agricoles - Carcassonne 1989 - SPV